

“환자는 수술 전날 밤에 소독제로 샤워나 목욕을 해야한다”

*“Every operation is an experiment in bacteriology.”
Imagine your surgeons saying that before a case today.*

“모든 수술은 박테리아 실험이다.”

- British abdominal surgeon Berkeley George Andrew Moynihan

WHO, CDC 강력 권고사항



CHG가 함유된 물로 씻어내는 항균피부 세정제!

그린헥시딘 세정액 4% -125mL


그린헥시딘 세정액은 항균력 99% 이상으로 바이러스를 포함한 다양한 균에 항균작용을 하며 Chlorhexidine Gluconate 이 지속적 항균력을 제공합니다.

세정액 사용 범위

- ❖ 수술 전 수술부위 피부소독
- ❖ 일반 피부 및 상처부위 세정
- ❖ 수술 시 손 소독
- ❖ 개인의 손 소독

수술 중 피부 배양 결과 (Shower / Scrub)

■ % Positive



[Reference]

Garibaldi, R. A., Skolnick, D., Lerer, T., Poiriot, A., Graham, J., Krisuinas, E., & Lyons, R. (1988). The impact of preoperative skin disinfection on preventing intraoperative wound contamination. *Infection Control and Hospital Epidemiology*, 9(3), 109-113. <https://doi.org/10.1086/645805>

컴팩트한 용량으로 더 위생적인 사용!


그린헥시딘 세정액 4% - 125mL

▶ 그린헥시딘 세정액의 특징


- 99% 이상의 지속적인 항균력으로 수술 후 감염예방을 높여줍니다.
- 작은 용량으로 위생적인 사용이 가능합니다.
- 일반의약품으로 분류되어 비급여 청구가 가능합니다.
- 개인 손소독 및 소독이 필요한 다양한 부위에 사용 가능합니다.



▶ 그린헥시딘 세정액 수술 전 피부소독 방법



온수를 사용하여 몸을 헹구어 주십시오.
그린헥시딘 세정액 4% 적당한 양을
덜어 타올에 묻힌 후 얼굴을 제외한
모든 중요 부위를 거품을 내어 2분 이상
문지르고 닦아 주십시오.



그린헥시딘 세정액 4% 적당한 양을
덜어 타올에 묻힌 후 얼굴을 제외한
모든 중요 부위를 거품을 내어 2분 이상
문지르고 닦아 주십시오.



약 1분이 지나고 다시 한번 온수로 몸을
헹구어 주십시오.



이 과정을 수술 전까지 최소 2회 이상
진행하여 주십시오.

* 다른 용도의 소독 세정시는 제품 상자를 참조하세요! (일반 피부 및 상처부위 세정, 수술 시 손 소독, 개인의 손 소독 등)

▶ 그린헥시딘 세정액 소독시 주의사항

- 얼굴 (눈, 귀, 입)부위에는 사용하지 마십시오.
- 충분히 거품을 내셨다면 바로 헹구지 마시고 1분 정도 대기 후 세척하세요.
- 환자의 민감도에 따른 피부자극이나 알레르기 반응이 생길 수 있습니다.



주문정보

표준코드	제품명	용량	주문정보
8806483011821	그린 헥시딘 세정액 4%	125ml	10 EA/1 Case
비급여코드 : 648301182			

제조원
그린제약
Green Pharmaceutical Co., Ltd
TEL: 080-852-7744

판매원
KIMCO
KOREA INTERNATIONAL MEDICAL DEVICE TRADING COMPANY
TEL: 02-449-8184