



Quality Medical Device



Safe & Effective & Cost-down

3M DuraPrep Surgical Solution

Patient Skin Preparation



Science.
Applied to Life.™



Winning the Battle Against SSIs

3M™ DuraPrep™ Surgical Solution

(Iodine Povacrylex [0.7% available iodine] and Isopropyl Alcohol, 74% w/w)

Patient Preoperative Skin Preparation

(lo

주식회사 큐메디케어

그린헥시딘세정액4% - SSI Free

Patient Shower & Skin Preparation



차이를 확인하세요

비교 성분명	듀라프렙 외용액	
	요오드 포바크릴렉스 (Iodine Povacrylex)	포비돈-요오드 (Povidone-Iodine)
한 겹으로 바른 소독액의 항균효과 ¹	Yes	No
세척(irrigation)에도 지워지지 않는 저항성 ²	Yes	No
지속적 항균력 - 혈액과 생리식염수 등에 젖은 후에도 최소 48시간* 지속되는 상재균에 대한 항균력 ³ - 일시적 오염균에 대한 항균력이 최소 12시간 지속 ⁴	Yes	No Unknown Unknown
피부 소독 후에 피부에 남아 있는 균이 이동하지 못하도록 고정시킴 ⁵	Yes	No
드레이프 점착력 증가 ^{2, 6, 7}	Yes	No

듀라프렙 사용법

사용 전에 손위생을 반드시 시행하세요.

Press




스폰지가 아래 쪽을 향하도록 쥐고, 다른 한 손으로 손잡이 부분 끝에 있는 뚜껑을 누르십시오. 소독액이 스폰지로 스며들 때까지 기다리십시오.

Ready




소독액의 높이가 스폰지 위쪽의 볼록한 실선에 오면 준비가 된 것입니다. (그림 속 화살표 참조)

Paint




소독액을 수술/시술 부위에 바릅니다. 피부에 가볍게 대고, 균일하게 한 겹이 칠해지도록 바르십시오. 문지르거나, 이미 바른 부분을 다시 바르지 마십시오. 만약 용액이 고이면, 바로 스폰지에 흡수시키고 소독액 바르기를 계속합니다.

Dry



소독액이 마르면서 광택이 있던 피부표면의 윤기가 사라집니다. 이와 동시에, 빠른 광범위 항균작용을 가지면서 오래 지속되는 수술전 피부 소독이 완료됩니다.

사용 가능 넓이



듀라프렙 1개 (26ml)
38.2 cm * 76cm area
≈ 2,900 cm²

수술포로 덮기 전에 소독액이 완전히 마르도록 기다리십시오. (체모가 없는 피부의 경우 최소 3분이 소요됩니다.) 빨리 말리기 위해 소독액을 닦아내지 마십시오. 배꼽 등에 소독액이 많이 고인 경우에는 멸균거즈로 흡수시키십시오.

비급여 청구 안내

- 상품명 : 듀라프렙 외용액 8630
- 효능.효과 : 수술전 환자피부 소독
- 일반의약품 - 대표코드 : 8806410000102 (듀라프렙 외용액)
표준코드 : 8806410000126 (듀라프렙 외용액 8630, 26ml)
- 비급여 청구 코드 - 표준코드의 붉은색 9자리 숫자가 약품 코드로 사용 됩니다.